

MUTATIONS ET DESCRIPTIONS
DE NOUVEAUX COLÉOPTÈRES ASIATIQUES ⁽¹⁾,

PAR M. M. PIC.

Cænobius Blaisei nov. sp.

Ovatus, nitidus, convexus, niger, labro antennisque ad basin testaceis, tursis rufescentibus et thorace antice paulo rufo marginato.

Ovalaire, convexe, brillant, noir avec la base des antennes et le labre testacés, les tarse et le rebord antérieur du prothorax un peu roussâtres. Prothorax court et large, rebordé et un peu arqué sur les côtés, rétréci en avant, à peine sinué et à lobe médian peu avancé en arrière, orné postérieurement d'une rangée transversale de points médiocres et, sur le reste, offrant une ponctuation espacée, en partie forte; écusson allongé; élytres courts, atténués postérieurement, fortement striés, ponctués avec les intervalles convexes. Long. : 2 millimètres environ.

Tonkin : Sept-Pagodes (L. Blaise).

Voisin de *C. chinensis* Baly, s'en distingue par le prothorax à lobe médian presque nul, le labre testacé, etc.

Apalochrus Blaisei nov. sp. ♂.

Oblongus, sparse griseo pubescens, nitidus, niger, supra paulo cyanescens, membris pro parte rufescentibus.

Oblong, orné d'une pubescence grise éparsée, en partie redressée, noir avec le dessus, tête exceptée, à reflets bleutés, membres en partie teintés de roux. Tête éparsément ponctuée, épistome testacé; antennes robustes, assez courtes; prothorax court et large, presque droit sur les côtés, rétréci en arrière, peu ponctué; élytres à peu près de la largeur du prothorax,

(1) Les types des nouveautés décrites dans cet article et originaires du Tonkin (sauf *Laius latemaculatus*, de la coll. Pic) appartiennent au Muséum de Paris, faisant partie de l'ancienne collection Ph. François, entrée dans cet établissement avec celle de L. Bedel. Des co-types de *Caenobius Blaisei*, *Carphurus Françoisi*, *Laius Blaisei* et *punctatipennis* figurent aussi dans la coll. Pic. Deux *Laius* Guer., de Formose, sont de ma collection.

courts, peu élargis en arrière, déprimés antérieurement, finement et densément ponctués; hanches dentées, tibias antérieurs un peu épaissis vers le milieu, échancrés et un peu coudés à l'extrémité, tibias intermédiaires épaissis et fovéolés en dessous. Long. : 3 millimètres.

Sept-Pagodes (L. Blaise).

Voisin de *A. cochinchinensis* Pic, s'en distingue, à première vue, par les élytres plus courts et les membres moins foncés.

Carphurus Françoisi nov. sp.

Elongatus, nitidus, parum hirsutus, fere impunctatus, niger, antennis ad basin testaceis, articulo 1° piceo notato.

Allongé, brillant, orné de quelques poils dressés, presque impunctué sauf sur les élytres qui le sont finement, noir, base des antennes testacée avec le 1^{er} article marqué de poix en dessus. Tête à peu près de la largeur du prothorax, yeux gros, écartés; prothorax pas très court, rétréci en avant, rebordé, un peu surélevé postérieurement; élytres de la longueur du prothorax, pas très longs, un peu élargis en arrière; abdomen débordant les élytres. Long. : 4 millimètres.

Rég. de Luc Nam. (L. Blaise).

Voisin de *C. homalioides* Brg., s'en distingue, à première vue, par les antennes largement testacées à la base et les élytres à fine ponctuation.

Laius curticornis nov. sp. ♂.

Oblongus, subnitidus, elytris opacis, breve pubescens, nigro-plumbeus, membris testaceis, nigro notatis, elytris testaceo fasciatis et maculatis.

Oblong, à peine brillant, élytres mats, orné d'une courte pubescence grise, noir plombé avec les membres presque entièrement testacés et les élytres ornés de dessins testacés. Tête triangulaire en avant, impressionnée et carénée au milieu, à ponctuation rapprochée, yeux saillants; antennes testacées avec le 1^{er} article taché de noir, celui-ci long et large, 3^e difforme, large, muni à la base et en dedans d'un appendice dentiforme, impressionné au sommet; prothorax assez court, élargi au milieu, rétréci en avant et postérieurement, densément ponctué; milieu un peu bombé; élytres plus larges que le prothorax, courts, élargis postérieurement, densément et ruguleusement ponctués, présentant les dessins testacés suivants : une fascie antérieure commune sur la suture en forme de X et prolongée postérieurement en bande sinuée jusque sur les bords des élytres, une macule humérale réduite et une autre antéapicale plus grosse; 4 pattes an-

téricures testacées avec les cuisses intermédiaires lineolées de noir, postérieures presque toutes noires. Long. : 3 millimètres.

Environs de Laur (L. Blaise).

Espèce des plus distinctes entre toutes par ses dessins élytraux particuliers.

Laius sexmaculatus nov. sp. ♀.

Oblongus, opacus, dense punctatus et breve pubescens, niger, vâge cyanescens, elytris antice breve albo fasciatis et postice, in singulo, albo bimaculatis.

Long. : 3 millimètres.

Formose.

Voisin de *L. hexastigma* Chp. par ses dessins élytraux mais moins court, tête et antennes foncées.

Laius latemaculatus nov. sp. ♀.

Oblongo-elongatus, opacus, dense punctatus et breve pubescens, niger, vage cyanescens, elytris antice et postice in disco late luteo maculatis.

Long. : 3 millimètres.

Tonkin : Hoa Binh (R. P. de Cooman, in coll. Pic).

Voisin de *L. malaccanus* Pic, très distinct par la forme plus allongée, la tête toute noire, les macules plus grosses.

Laius punctatipennis nov. sp.

Oblongus, nitidus, sparse pubescens et hirsutus, niger, elytris subviolaceis, testaceo fasciatis, antennis ad basin rufis, capite antice ♂ testaceo maculato.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence espacée avec des poils dressés, noir, élytres un peu violacés, ornés d'une large fascie médiane testacée, base des antennes marquée de roux et tête chez ♂ maculée de testacée antérieurement. Tête courte et large, peu ponctuée, yeux peu saillants; 1^{er} article des antennes ♂ long et large, 3^e long et creusé, denté sur sa base antérieure, ces articles simples et longs chez ♀; prothorax assez court, fortement étranglé et rétréci postérieurement, d'ordinaire finement ponctué sur le disque et plus fortement sur les bords, au moins chez ♀; élytres plus larges que le prothorax, assez courts, élargis postérieurement, en partie finement, en partie fortement, ponctués. Long. : 2,5 millimètres.

Environs de Laur. (L. Blaise.)

Très voisin de *L. fasciatus* Brg., s'en distingue par la structure des antennes du ♂, la ponctuation en partie très forte sur les élytres.

Laius Blaisei nov. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, niger antennis ad basin rufis, elytris antice late, postice breve, rufoluteo maculatis.

Oblong-allongé, brillant, orné de poils dressés, noir, parfois un peu teinté de bleuâtre sur l'avant-corps, avec les élytres bimaculés de roux et jaune et la base des antennes rousse. Tête presque lisse, bicarénée chez ♂, yeux saillants; antennes ♂ à 1^{er} article long, courbé et épaissi au bout, 3^e difforme, cupuliforme et courbé, bidenté d'un côté en dessus, prolongé à l'autre extrémité sous forme de dent large et longue, ces articles simples et allongés chez ♀; prothorax assez étroit, rétréci en arrière, presque lisse; élytres au milieu fortement et peu densément ponctués. Long. : 3,5-3,8 millimètres.

Long-Luong, Sept-Pagodes (L. Blaise).

Très voisin de *L. javanus* Pic, mais structure du 1^{er} article des antennes du ♂ tout autre.

Laius var. nov. **albonotatus** ♂.

Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, niger, antennis ad basin rufis, elytris antice late rufo-luteo et postice albo maculatis.

Long. : 3,5 millimètres.

Formose.

Diffère de *Blaisei* par le 1^{er} article des antennes subdenté en dessous avec la macule postérieure des élytres blanche, au lieu d'être un peu jaunâtre.

Les ♂ de cette dernière espèce et de *L. javanus* Pic peuvent se distinguer de la façon suivante :

1. Premier article des antennes long et élargi au bout, 3^e difforme, creusé, reconrbé aux extrémités, longuement denté sur sa partie inférieure.

— Premier article des antennes large, subtriangulaire, 3^e subcarré, denté sur sa partie antérieure (dent dirigée sur le dessus du 1^{er} article), non denté inférieurement.

Java.

javanus Pic.

2. Premier article des antennes n'apparaissant pas nettement denté à son extrémité inférieure; macule postérieure des élytres au moins un peu jaunâtre.

Tonkin.

Blaisei Pic.

— Premier article des antennes nettement denté à son extrémité inférieure; macule postérieure des élytres blanche.

Formose.

Blaisei v. *albonotatus* Pic.

Hylophilus multispinosus nov. sp. ♂.

Oblongus, nitidus, sat longe et hirsute griseo pubescens, rufo-testaceus, capite nigro, femoribus posticis brunnescentibus, infra multi spinosis.

Oblong, brillant, orné d'une assez longue pubescence grise en partie redressée, roux-testacé avec la tête noire et les cuisses postérieures rembrunies. Tête large, tronquée postérieurement, finement et éparsément ponctuée, yeux grands, rapprochés sur le front; antennes longues, peu robustes, à 3^e article plus long que le 2^e, dernier long, subtronqué et acuminé au sommet, prothorax relativement court et large, rétréci en avant avec les angles nuls, fortement et densément ponctué; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, rétrécis postérieurement, à peine impressionné en avant, fortement et densément ponctués; pattes antérieures grêles, tibias intermédiaires courbés et un peu épaissis, cuisses postérieures fortes, ornées en dessous de nombreuses et fines épines, tibias droits. Long. : 2 millimètres environ.

Hanoï (de Vaalger).

Voisin de *H. Coomani* Pic et s'en distinguant par les cuisses postérieures ornées de nombreuses épines, le dernier article des antennes moins épaissi, la ponctuation plus dense du prothorax, etc.

PTILODACTYLA CURTA Pic (*Bull. Mus. Paris*, 1925, p. 183) préoccupé par *P. curta* Pic (1923), devra prendre le nom nouveau de **curtula**.

ADOCETA ALLUAUDI Pic (*Bull. Mus. Paris*, 1925, p. 186) préoccupé par *P. Alluaudi* Peyer. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1925, p. 55), paru quelques jours avant, devra prendre le nom nouveau de **differens**.